




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 20.07.2026.–26.07.2026. године

Током седмице преовладало је промјенљиво облачно вријеме са честом појавом кише и локалних пљускова праћени грмљавином. Локално су забиљежене временске непогоде праћене градом и појачаним вјетром.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 12 до 16, у нижим од 18 до 20, на југу до 23, док се максимална дневна кретала у интервалу од 18 до 26 у вишим крајевима, у низинама од 26 до 31, на југу до 35⁰С.



Температурни услови током протеклог периода омогућавали су развој кукуруза, сунцокрета, соје и шећерене репе, као и зрење воћа и поврћа.

Током посматране седмице забиљежене су падавине локалног карактера, које су биле неравномјено распоређене по количини и интензитету. На већем дијелу Српске падавине су биле испод просјека. Честа појава кише и не баш екстремно топло вријеме погодује свим пољопривредним усјевима.

У наредном периоду потребне су нове падавине, како би се обезбиједиле нове залихе за даљи наставак вегетације.



У овом седмодневном периоду било је промјенљиво вријеме уз сунчане периоде, што је одговарало за интензивнију појаву инсеката штеточина. У засадима шљива активна је трећа генерација шљивиног смотавца, а у засадима крушака забиљежено је присуство обичне крушкине буге. У усјевима кукуруза присутане су одрасле јединке кукурузне златице.



Шљивин смотавец

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

(период: од 27.07.2026. до 02.08.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а током седмодневног периода предвиђа се сунчано и веома топло вријеме, нарочито од сриједе, када ће температуре из дана у дан постепено расти и достизати надпросјечне вриједности. Почетком седмице мјестимично су могући локални пљускови праћени грмљавином уз јаче падавине на југу Херцеговине.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 13 до 16, у нижим од 18 до 24, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 24 до 32, у вишим крајевима, у низинама од 31 до 39⁰С.

Препоручује се да актуелне пољопривредне радове треба изводити у раним јутарњим и касним послеподневним часовима због високог УВ зрачења.

Високе температурне ваздуха без падавина, у наредном периоду ће узроковати проблеме при узгоју јарих усјева. Због високих температура ваздуха и дуготрајне инсолације препоручује се наводнавање, нарочито код биљака са плитким корјеновим системом.