




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 03.08.2026.–09.08.2026. године


Током ове седмице на цијелом простору Српске преовладало је сунчано, веома вруће и спарно вријеме.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 14 до 18, у нижим од 18 до 22, на југу до 25 док се максимална дневна кретала у интервалу од 28 до 34 у вишим крајевима, у низинама од 33 до 39, локално и до 41⁰С.



Топлотни талас забиљежен крајем јула и у првој декади августа веома се неповољно одражава на све пољопривредне културе, а нарочито на кукуруз, који је у фази оплодње и соју у фази формирања махуна. Такође, температуре преко 35°C не погодују ни сунцокрету, јер ометају синтезу уља у сјемени.

Током посматране седмице није било падавина, тако да у већем дијелу преовладава умјерена до екстремна суша, тако да су у тим подручјима усјеви у лошијем стању, до сада су неповољне услове влажности подносили само захваљујући нешто свјежијим ноћима. Агрометеоролошки услови, у подручјима где је у претходном периоду било више кише, били су повољни за одвијање фенофаза код јарих усјева и дозревање и бербу пристиглог воћа. У наредном периоду неопходне су нове обилније падавине, како би се обезбједиле нове залихе за даљи наставак вегетације.



У овом седмодневном периоду било је сунчано и веома топло вријеме, што је одговарало за интензивнију појаву инсеката штеточина. У засадима шљива активна је трећа генерација шљивиног смотавца, а код крушаке забиљежено је присуство обичне крушкине буве.

У засадима јабуке, поред јабукиног смотавца, уочено је и присуство трипса.

У усјевима кукуруза присутане су одрасле јединке кукурузне златице, а код кромпира убрзан развој кромпировог мољца.



Кукурузна златица

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

(период: од 10.08.2026. до 16.08.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а током седмодневног периода наставља се сунчано, вруће и спарно вријеме.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 14 до 18, у нижим од 18 до 25, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 26 до 34, у вишим крајевима, у низинама од 31 до 39⁰С. Средином седмице доћи ће до мањег пада температуре ваздуха.

Препоручује се да актуелне пољопривредне радове треба изводити у раним јутарњим и касним послеподневним часовима, због веома врућег времена и високог УВ зрачења.

Високе температурне ваздуха без падавина, у наредном периоду ће узроковати проблеме при узгоју јарих усјева. Због могућег настанка ожеготина на биљкама препоручује се засјењивање. Усљед високих температура ваздуха и дуготрајне инсолације препоручује се наводнавање, нарочито код биљака са плитким корјеновим системом.