




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА**

Преглед стања за период 24.08.2026.–30.08.2026. године

Током и овог седмодневног периода на цијелом простору Српске преовладало је сунчано и веома топло вријеме, нарочито у петак. Током уторка само је мјестимично забиљежена слаба киша или локални пљусак.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 12 до 16, у нижим од 17 до 24, док се максимална дневна кретала у интервалу од 26 до 34 у вишим крајевима, у низинама од 31 до 41⁰С.



Већ мјесец дана преовладавају веома неповољни агрометеоролошки услови за све пољопривредне културе. Веома високе температуре и недостатак падавина ометају наливање плодова код свих актуелних усјева и убрзавају зрење, чине да се у великој мјери смањује и квалитет и висина приноса.

Такође, висока инсолација доводи до ожеготина плодова воћа.

Почетком посматране седмице мјестимично је било слабих падавина, које нису имале велики значај на пољопривредне културе. У свим подручјима преовладава јака до екстремна суша.



Дуготрајан период екстремно високих температура, изостанак падавина и изражени недостатак влаге у земљишту погодују убрзаном развоју и повећаној активности бројних штеточина, међу којима се издвајају трипси, гриње, кукурузни пламенац, кукурузна (памукова) совица и друге штеточине које у условима високих температура могу представљати ризик за производњу. Тренутно је у засадима јабуке активна трећа генерација, а у засадима крушке присутна су јаја и млађих ларвених стадијума обичне крушкине буве.



Крушкина бува

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

(период: од 31.08.2026. до 06.09.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а почетком седмодневног периода очекује се сунчано и веома топло вријеме. Средином седмице температуре ће бити мало ниже, да би од викенда поново дошло до пораста дневне темпартуре ваздуха. Мјестимично у првој половини седмице могућа је слаба киша или локални пљусак.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 11 до 15, у нижим од 14 до 21, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 22 до 30, у вишим крајевима, у низинама од 29 до 35⁰С.

Усљед високих температура ваздуха и дуготрајне инсолације, препоручује се наводњавање уз рационално кориштење воде, нарочито код биљака са плитким корјеновим системом.